


AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES ®

STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

Départements : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne



Ministère de l'Agriculture
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

62, avenue Nationale - La Neuville
 B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX
 Téléphone : (26) 09.06.43

PUBLICATION PÉRIODIQUE
 Abonnement annuel : F

ÉDITION SPÉCIALISÉE - GRANDES CULTURES

DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

BULLETIN N° 32 du 16 Décembre 1985
 Envoi n° 30

ABONNEMENT ANNUEL : -1-
 Edition A ou B : 150 F
 Edition A + B : 285 F

COLZA	NE PAS INTERVENIR	Larves d'altises et charançons.
	AGIR	Désherbage
	NE PAS INTERVENIR	Cylindrosporiose.
CEREALES	FIN DE RISQUE	Pucerons.
TOUTES CULTURES	SURVEILLER	Limaces.
	S'INFORMER	Réglementation des produits antiparasitaires.

COLZA

Les stades varient de 4 à 8 feuilles, les diamètres du pivot de 4 à 12 mm selon les conditions de semis.

Désherbage:

De nombreuses parcelles sont fortement enherbées. La sécheresse au semis a diminué l'efficacité des traitements de pré-semis. Dans de nombreuses parcelles, les populations d'adventices nécessitent une intervention de rattrapage.

Larves d'altises et de charançons du bourgeon terminal :

Situation:

Les derniers contrôles réalisés en début de mois confirment le très faible niveau des populations sur l'ensemble de la région.

Quelques résultats de comptages:

Commune	LARVES SUR 25 PIEDS	
	Altises	Charançons
St Fergeux 08	0	0
Chaumont-Porcien 08	0	0
Blaize sous Arzillières 51	6	0
Merlaut 51	0	0

Préconisation:

Dans la majorité des situations,
NE PAS INTERVENIR

Si cela n'est pas déjà fait, visiter rapidement les parcelles mal protégées contre les adultes.

Cylindrosporiose :

Cette maladie est toujours absente.
 Un nouveau point sera fait courant février.

CEREALES**Pucerons :**

La remontée des températures n'a pas provoqué le développement des populations de pucerons.

FIN DE RISQUE POUR CE RAVAGEUR.

Limaces :

Ces ravageurs peuvent provoquer de sérieux dégâts en quelques jours.
Le maintien d'un temps doux leur est très favorable.

VISITER REGULIEREMENT VOS PARCELLES.

Dès l'apparition des premiers dégâts, épandre des granulés à base de métaldéhyde ou de mercaptodiméthure.

Les situations à surveiller en priorité sont:

- les parcelles en bordure de bois, de haies, talus ou prairies
- les sols creux ou motteux.

APPLICATION DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES ET AUTORISATION D'EMPLOI

Deux textes importants ont été publiés au journal officiel du 15 Juillet 1985:

- l'arrêté du 5/07/1985 relatif à l'application des produits antiparasitaires à usage agricole
- l'arrêté du 5/07/1985 relatif à la délivrance d'autorisation d'emploi des produits antiparasitaires à usage agricole

APPLICATION DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE

L'application des produits antiparasitaires est désormais strictement limitée aux seuls emplois et catégories d'emploi pour lesquelles les spécialités sont homologuées.

Par cet arrêté, nous entrons dans un système de "listes positives": désormais, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit.

Ce principe a pour objet d'éviter les déviations d'usage. Des exceptions sont prévues pour répondre aux cas d'urgence ou de nécessité.

Un délai maximum de 3 ans est prévu pour permettre une mise en place progressive de cette réforme.

D'autre part, afin de respecter les directives européennes interdisant l'utilisation des mentions négatives de risque telles que "non toxiques", "non dangereux", toutes les spécialités auxquelles le Ministre de l'Agriculture a accordé la mention "non dangereux pour les abeilles" devront être révisées.

DELIVRANCE D'AUTORISATION D'EMPLOI DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE

Ce second arrêté organise la procédure en 3 étapes:

1°) Possibilité pour les utilisateurs d'exprimer leurs besoins par le biais de la Commission des Produits Antiparasitaires.

2°) Les fabricants peuvent donner une suite favorable aux besoins des utilisateurs ou présenter des arguments contraires.

3°) En cas de désaccord, l'Administration se réserve le droit de délivrer des autorisations d'extension d'emploi.

Nous vous tiendrons informés de l'évolution de l'application de ces textes.

TABLEAU DES HERBICIDES UTILISABLES EN POST-LEVÉE DU COLZA

Matières actives	Spécialités commerciales	Dose de spécialité à l'ha	Epoque d'application	Observations	Action sur	
					graminées	dicotylédones
Alloxydime-sodium	FERVIN	1 kg	Utilisable à tout stade du colza, de la levée au stade montaison des graminées.	L'adjonction d'huile (à 3 l/ha) est conseillée contre graminées vivaces. Appliquer sur végétation active.	bonne sauf sur pâturin	
Carbétamide	LEGURAME PM	3 kg	Dès le stade 4 feuilles du colza, jusqu'à 3 semaines avant reprise de végétation.	Utilisable même sur sol gelé.	bonne	insuffisant
		4/5 kg	De novembre à fin janvier.	Contre chiendent.		
Carbétamide + diméthuron	PRADONE TS	3,5 kg	Dès le stade 4 feuilles du colza.	Utilisable même sur sol gelé.	bonne	céraistes coquelicots moucons véroniques
3,6 D.C.P.	LONTREL SF 100	1 l	Quel que soit le stade du colza.	Utiliser sur mauvaises herbes développées par 1 ^{re} supérieures à 10°.		anthémis matricaires
Fluazifopbutyl	FUSILADE ou FUSILADE X 2	1,5 l	Dès le stade cotylédonaire du colza, quel que soit son stade.	Utiliser très précocement, dès la levée des adventices. L'adjonction d'un mouillant (AGRAL à 0,1 % en volume est conseillée.	bonne sauf sur pâturin	
		0,7 l				
Propyzamide	KERB 30 W	1 kg	Dès le stade 3 feuilles du colza, jusqu'à la reprise de végétation.	Utilisable sur sol gelé. La dose peut être augmentée sur graminées vivaces (3 kg sur chiendent agropyrum).	bonne	insuffisant
Propyzamide + diuron	KERB-ULTRA	1,2 kg	Dès le stade 4 feuilles du colza.	Utiliser sur colzas bien implantés, de préférence avant l'hiver	bonne	sanves ravelles
Sethoxydime	FERVINAL	2,5 l	Quel que soit le stade du colza.	L'adjonction d'huile SCHE-RING (3 l/ha) est conseillée pour lutter contre graminées vivaces.	bonne sauf sur pâturin	
Quizalofop éthyl	TARGA	1,25 l	Quel que soit le stade du colza.	L'adjonction d'huile (2 l/ha) est conseillée contre graminées vivaces.	bonne	manque de précision

